

Manual til FMK



DET FÆLLES MEDICINKORT



Indhold

Fælles Medicinkort	3
Datoer vedr. en ordination i FMK.....	3
Symboler/ kolonner	4
Øverste bjælke.....	4
Ny ordination.....	7
Substitution og tilskud	11
Dubletkontrol	11
Seponér.....	12
Yderligere muligheder i højrekliksmenuen	12
Vis Alt	12
Gruppér på ATC	12
Opret ordination u/recept.....	13
Genordiner recept	13
Vis/ret ordination	13
Pausér/ophæv pausering	14
Interaktionskontrol	15
Vis effektueringer	15
Opret effektuering.....	15
Markér medicinkortet som ajourført	16
Recepter	16
Tilknyttede recepter	18
Begreber i FMK	19

Fælles Medicinkort

Overordnet set er FMK en online tjeneste, der giver sundhedspersonale indblik i, hvad/hvilke præparater en patient i deres praksis er i behandling med, hvad enten det er lægen, tandlægen eller sygehuset, der er den behandlende part. Ordinationer gemmes på FMK i 2 år.

Nedenstående skærbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK.

Placér musen på et felt, og en boks med evt. yderligere oplysninger vises

Klik på en kolonne - overskrift, så sorteres ordinationerne efter denne kolonne (f.eks. præparat).

En læge/tandlæge kan markere FMK som ajourført som et signal til andre om, at FMK på den dato er gennemgået og stemmer med det faktiske, som patienten er i behandling med.

Viser hvornår FMK er hentet. Hvis programmet ikke kan få adgang til FMK, vises patientens sidst hentede medicinkort.

S	D	T	Ændret	Ophører	Præparat	Form	Styrke	Indikation	Dos. Start	Dos. Slut	Dosering	Udleveret	R
∞	02-03-16				Marevan	tabletter	2,5 mg	blodfortyndende	04-04-2016		1 tablet morgen og aften		
∞	02-02-16				Opretret 07-10-2015 17:54 af: Grete Bach (WNP01)	høvertrukne tabletter	400 mg	mod muskelsmerter			1 tablet 3 max gange daglig		
∞	05-01-16				Læge i Bartholinsgade (Ydemr.: 5193)	psler, hårde	20 mg	mod stærke smerter			1 kapsel 3 gange daglig		
∞	04-11-16				Bartholinsgade 6 R	tabletter	m D-vitamin	kalktilskud			1 stk daglig		
∞	07-10-16				1356 København K	aktionsvæske, opløsning	5 mg/ml	til epidural analgesi			Dosering efter skriftlig anvisning		
∞	19-04-16				Tlf: 38104040	erokapsler, hårde	20 mg	mod mavesyre i spiserøret			2 kapsler daglig		
∞	02-03-20		10-06-2016		Panodil	filmovertrukne tabletter	500 mg	mod smerter			1 tablet 3 gange daglig		
∞	07-10-2015	22-05-2016			Marevan	tabletter	2,5 mg	blodfortyndende	07-10-2015		1 tablet morgen og aften		
U	04-04-2016	04-05-2016			Methotrexat "Sandoz"	tabletter	2,5 mg	mod psoriasis			5 tabletter samtidigt 1 gang ugentlig		

Ændret viser den dato, som ordinationen er oprettet/sidst ændret på FMK. I Ophører står den dato, som behandlingen er sat til at slutte, med mindre ordinationen er markeret som, at patienten er i fast behandling med dette.

Hvis patienten er i behandling med blodfortyndende medicin eller bisfosfonat, så markeres disse ordinationer med lyserød. Således at de fremstår tydeligt.

Det er muligt at få flere oplysninger vedr. recepter vist i FMK. Læs mere senere i vejledningen.

Bemærk at patienter, som ikke har dansk bopæl og et gyldigt dansk CPR-nummer, heller ikke har et FMK medicinkort.

Datoer vedr. en ordination i FMK

Ordinationsdato: Overordnede datoer for hvornår en ordination starter (lægges på FMK) og ophører på FMK. På medicinkortet vises det, hvornår ordinationen sidst er ændret samt evt. ophører. En ændring af ordinationen betyder, at der er ændret i dosering, varighed eller præparat. Genordination af en recept er ikke en ændring af ordinationen.

S	D	T	Ændret	Ophører	Præparat	Form
∞			04-07-2016		Brentan	creme
∞			03-07-2016		Kodein "Alternova"	filmovertrukne tablet...

Behandlingsstart-/slut: Hvornår patienten er i aktiv behandling med præparatet i ordinationen. Behandlingsstart kan f.eks. godt ligge efter den dag, som ordinationen lægges på FMK, hvis aftalen med patienten er, at vedkommende først starter selve behandlingen nogle dage senere. Det kan også være, at patienten kun er i behandling i nogle perioder f.eks. ved høfeber.

Doseringsstart-/slut: Hvis doseringen af præparatet skal op- eller nedtrappes, kan der indenfor en behandlingsperiode godt være flere forskellige doseringsperioder, hvor patienten får forskellige dosis af samme præparat.

Symboler/ kolonner

I første kolonne *S* vises status på ordinationen.

Intet symbol/bogstav = Temporær ordination, der stadig er aktiv

∞ = Fast ordination

U = Udløbet

S = Seponeret

P = Pauseret

A = Afsluttet dosering (ordinationen er stadig aktiv, men doseringsperioden er afsluttet)

I anden kolonne *D* er det markeret, hvis recepten er dosisdispenseret.

d = Dosisdispenseret recept, men endnu ikke overført til dosisdispenseringskort (på apoteket).

D = Dosisdispenseret recept der er overført til dosisdispenseringskort (på apoteket).

? = Der er en aktiv dosisdispenseringsrecept, men der er IKKE udleveret på den indenfor de seneste 14 dage.


I tredje kolonne *T* vises følgende symbol, patienten opfylder betingelserne for klausuleret tilskud.

S	D	T	Ændret	Ophører
∞			23-05-2016	

Øverste bjælke

I den øverste bjælke på medicinkortet kan der vises nogle yderligere markeringer.

Hvis en patient indlægges på et sygehus, kan sygehuset suspendere medicinkortet på FMK for at fortælle, at medicinkortet ikke er opdateret og derfor ikke nødvendigvis er retvisende. Når patienten udskrives, skal ordinationerne overføres til FMK, og suspenderingen ophæves. Suspenderingen bør ophæves af den, der har lavet suspenderingen. Hvis sygehuset glemte at ophæve suspenderingen efter patientens udskrivelse, bør du rette kontakt til den ansvarlige her. Suspendering vises med en tydelig gul markering på FMK. Det er stadigvæk muligt at se og arbejde i medicinkortet.



Der kan også være en markering om, at der er privatmarkeret ordinationer på FMK.

Patienten kan bede om at få en ordination privatmarkeret, således at den skjules. Når der logges på patientens FMK, vil der kun kunne ses, at der findes en eller flere ordinationer med privatmarkering, men ikke hvad ordinationen indeholder.

Hvis du ønsker at privatmarkere en ordination, skal du højreklikke på Ordinationen og vælge *Vis/ret ordinationen*. Du skal sætte flueben i tilvalget *Privatmarkeret*.



Når du herefter åbner medicinkortet, vises privatmarkeringen af præparatet med et ikon, der forestiller en hængelås.

Andre end den klinik, der har privatmarkeret ordinationen, vil i stedet for ordinationen få vist en besked om, hvor mange privatmarkeret ordinationer, der er skjult på medicinkortet.

det fælles medicinkort					4 Privatmarkerede bliver ikke vist ←	
S	D	T	Ændret	Ophører	P	Præparat
∞			23-05-2016			Ibumax

Hvis der på en patients FMK er privatmarkerede ordinationer, som er ordineret af en anden læge/tandlæge, er det muligt at se disse, hvis nødvendigt. Højreklik her for at få menuen frem.

det fælles medicinkort					4 Privatmarkerede	
S	D	T	Ændret	Ophører	P	Præparat
∞			23-05-2016			Ibumax

Hent privat markerede ordinationer, UDEN patientens samtykke (Værdispring)
 Hent privat markerede ordinationer, med patientens samtykke

Bemærk, at muligheden for at hente privatmarkerede ordinationer UDEN samtykke absolut kun bør benyttes i de tilfælde, hvor værdispringsreglen træder i kraft. Se evt. afsnittet om "Begreber i FMK" bagerst i denne vejledning.

Ny ordination

For at lave en recept på et nyt præparat (ny ordination) skal du højreklikke på FMK vinduet. Så vises en højrekliksmenu, hvori du kan vælge *Opret recept fra medicinfortegnelsen* (genvejstast INS).

S		D	T	Ændret	Ophører	Præparat	Form	Styrke
∞				17-05-2016		Ibandronsyre "Medical Valley"	filmoverttrukne tabletter	150 mg
∞				04-04-2016		Marevan	tabletter	2,5 mg
∞				02-03-2016		Lariam	tabletter	250 mg
∞				02-02-2016		Ibumetin		mg
∞				05-01-2016		Oxynorm		mg
∞	d			04-11-2015		Unikalk Forte		vitamin
∞				07-10-2015		Marcaïn Spin		y/ml
				19-04-2016	08-06-2016	Omeprazol "A		mg
				02-03-2016	10-06-2016	Panodil		mg
				07-10-2015	22-05-2016	Marevan		mg
U				04-04-2016	04-05-2016	Methotrexat "		mg

- Vis alt
- Gruppér på ATC
- Opret ordination u/recept
- Opret recept fra medicinfortegnelsen INS**
- Opret magistrel ordination
- Opret stdord. recept
- Genordiner recept
- Vis / Ret ordination

Herefter vises følgende vindue, hvori du kan søge efter præparat.

Medicin søgning

Præparat		Udgået
A-Derma Primalba	frihandelsvarer/mærkevarer	
Imedeen Prime renewal	frihandelsvarer/mærkevarer	
Montelukast 'Nordic Prime'	andre systemiske midler mod obstruktiv lungesygdom	
Olanzapin 'Nordic Prime'	antipsychotica	
Primafenadin	antihistaminer til systemisk brug	
Primapore	frihandelsvarer/mærkevarer	
► Primocillin	beta-lactam antibakterica, penicilliner	
Primesource Latex	frihandelsvarer/mærkevarer	
Primesource Nitrl	frihandelsvarer/mærkevarer	
Primesource Vinyl	frihandelsvarer/mærkevarer	
Primidon 'ERA'	antiepileptica	
Primperan	propulsives	
Quetiapin 'Nordic Prime'	antipsychotica	Udgået
Trimethoprim '1A Farma'	sulfonamider og trimethoprim	Udgået

Du kan slå det markerede præparat op på Promedicin.dk

Programmet begynder automatisk at søge, når du har angivet min. 2 karakterer i feltet.

Præparat

Søgning: prim

Opslag Synonym Analog Aft

Dobbeltklik/ tryk *Enter*/ *pil til højre* på det ønskede præparat for at komme videre til næste vindue.

Medicin søgning

Primcillin

Form	Styrke	PpD	Udlv.
Gran. til oral susp.	50 mg/ml		B
Gra. oral sus., endos	250 mg		B
▶ Tabletter, filmovertukne	250 mg		B
Tabletter, filmovertukne.	400 mg		B
Tabletter, filmovertukne.	800 mg		B

Præparat Form

Opslag Afbryd Vælg

Vælg form på samme måde.

Medicin søgning

Primcillin, Tabletter, filmovertukne, 250 mg

Pakning	Handelsnavn	Pris	Pris Pr. DDD	Importer
▶ 20 stk.	Primcillin	61,80	24,720	

Præparat Form Pakning

Du kan vælge at få vist synonympræparater til det valgte.

Opslag Synonym Synonym, anden styrke Synonym, anden form Afbryd Vælg

Vælg pakning.

Medicin søgning

Primcillin, Tabletter, 250 mg, 20 stk.

Indikation

- <Vælg indikation>
- mod betændelse i skeden
- mod bihulebetændelse
- mod Borrelia-infektion
- mod børnesår
- mod dyre- eller menneske- bid
- mod halsbetændelse
- mod hud- og bløddels- infektion
- mod inficeret eksem
- mod lungebetændelse
- mod mellemørebetændelse
- mod opblussen i kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)
- mod psoriasis med infektion
- mod rosen
- mod skarlagensfeber
- mod syfilis
- Egen indikation

Hvis du ønsker at angive en anden indikation end de foreslåede, så vælg *Egen indikation*. Så får du i et senere vindue mulighed for at skrive denne.

Præparat Form Pakning **Indikation**

Opslag Afbryd Vælg

Vælg indikation.

Medicin søgning

Primcillin, Tabletter, 250 mg, 20 stk.

Dosering

- <Vælg dosering>
- 1 tablet 2 gange daglig
- 1 tablet 3 gange daglig
- 2 tabletter 2 gange daglig
- 2 tabletter 3 gange daglig
- dosering efter skriftlig anvisning
- Egen dosering

Præparat Form Pakning Indikation **Dosering**

Opslag Afbryd Vælg

Vælg dosering.

Ordnation for [REDACTED]

Præparat: Primicillin
Form: filmovertrukne tabl.
Styrke: 250 mg
Pakning: 20 stk.
Indikation:
Adm. vej: Oral anvendelse

ATC: J01CE02

Tilvalg
☐ Substitution
☐ Privatmarkeret

Særligt tilskud
☐ Tilskud

Dosering

Doseringstype er enten "fast", "efter behov" eller "kombineret". **BEMÆRK** at fast dosering ikke må forveksles med fast medicin/fast behandling. Fast dosering betyder, at patienten tager medicinen efter et fast mønster. Dette kan også gælde for en penicillin kur, som patienten tager efter et fast mønster i f.eks. 7 dage.

Behandlingen står automatisk til at starte dags dato. Du kan ændre i starttidspunkt og eller varighed/sluttidspunkt. Hvis der ikke angives en slutdato, så markeres ordinationen som fast medicin.

Dosering start: 17-05-2016 Varighed: Dag(e) Dosering slut:

Vælg doseringstype: ☐ Fast dosering ☐ Efter behov ☐ Kombination


Behandlingstid
☒ Start angives 17-05-2016 Varighed: Dag(e) Behandling slut:

Udlevering
Antal: Udlevering: X Dage

Hvis der skal udleveres flere pakninger, eller der skal kunne udleveres flere gange på recepten, skal dette angives her. (Antal= antal pakninger pr gang, Udlevering= Hvor mange gange kan der udleveres på recepten x hvor lang tid skal der min. gå imellem hver udlevering. Ellers kan patienten hente den valgte pakning på apoteket én gang.

Klik på OK (F10) for at godkende ordinationen.

Du kan nu vælge, om recepten skal på receptserveren, eller om du ønsker at sende den til et bestemt apotek.



Navn	Adresse	PostNr & By	Telefon	EDI-adresse
Receptserveren	Axel Heides Gade 1	2300 København S	44889191	5790000155811:14

Receptserveren foreslås automatisk.

Du kan markere et apotek favorit vha. ikonet i øverste venstre hjørne. Så gemmes det under fanebladet *Foretrukne*.

De sidst brugte apoteker, kan findes under dette faneblad.

Men du kan vælge at søge efter et bestemt apotek vha. fanebladet *Søgning*.


Foretrukne Sidst brugte Søgning

Afbryd Vælg

Tryk *Enter* eller klik på *Vælg* for at sende recepten til det valgte udleveringssted.

Substitution og tilskud

I ordinationsbilledet er der nogle ekstra tilvalg, der markeres tydeligt røde, hvis der er noget, du skal være opmærksom på.



Ordnation for [Patient Name]

Præparat: Victoza

Form: inj.væske, opl., pen

Styrke: 6 mg/ml

Pakning: 2 stk. (Orifarm)

Indikation: behandling af d

Adm. vej: Subkutan anven

ATC: A10BX07

Tilvalg:

- ☒ Substitution
- ☐ Privatmarkeret

Særligt tilskud:

- ☐ Tilskud
- Vis

Hvis det er valgt fra, at et præparat kan substitueres, markeres feltet rødt.

Hvis det er muligt for patienten at få klausuleret tilskud til præparatet, så markeres feltet rødt.

Hvis du klikker på *Vis*, så kommer en boks med betingelserne for, at der kan gives tilskud.

Dubletkontrol

Hvis du opretter en ordination, hvor der allerede findes en aktiv ordination, vises en "FMK Dubletkontrol", som advarsel om at den allerede eksisterer.


Opret kun ordinationen som ny, hvis det er korrekt, at de begge skal være på FMK.



Seponér

Ønsker du at seponere (slette) en ordination på FMK, skal du højreklikke på ordinationen og vælge *Seponer*.

Hvis der ligger aktive recepter tilknyttet denne ordination på Receptserveren, kommer følgende vindue. Som standard bør du sige *Ja* til, at aktive recepter annulleres, da patienten ellers fortsat kan hente præparatet på apoteket, selvom ordinationen er seponeret.



Du kan ophæve en seponering igen vha. højrekliksmenuen. Bemærk at evt. annullerede recepter ikke bliver aktive igen ved ophævelse af seponeringen.

Yderligere muligheder i højrekliksmenuen

Vis Alt

Viser også udløbne og seponerede ordinationer for de sidste 2 år.

Gruppér på ATC


Sorterer ordinationerne på ATC-koder i stedet for efter dato. En kolonne med bogstavet fra ATC-koden vil fremkomme.

Opret ordination u/recept

Denne mulighed kan benyttes, når du ønsker at lægge en ordination på FMK, uden at der laves en recept. (hvis patienten fx tager noget håndkøbsmedicin, eller hvis det er medicin, som du udleverer eller indgiver til patienten) (Se gerne "Opret effektivering").

Genordiner recept

For at genordinere en recept skal du højreklikke på ordinationen i FMK og vælge *Genordiner recept*. Herefter kommer der et vindue frem med oplysninger om den valgte ordination. Du kan vælge at ændre på pakningen eller i doseringen, inden selve recepten laves.



Klik på **OK (F10)** for at fortsætte. Ligesom ved en ny ordination skal du herefter vælge, hvor recepten skal sendes hen.

Vis/ret ordination

Du kan se ordinationsvinduet for en eksisterende ordination samt rette på ordinationen.

Ordination for [redacted] X

Præparat: ATC:

Form:

Styrke:

Indikation:

Adm. vej:

Tilvalg

☐ Substitution

☐ Privatmarkeret

Særligt tilskud

☐ Tilskud

Dosering

☒ Særlig ☐ Komplex ☐ Fri tekst

Morgen: Middag: Aften: Nat: Enhed:

Supplerende oplysninger:

☐ Efter Behov

Dosering start: Varighed: Dosering slut:

☐ Slut angives

Behandlingstid

☒ Start angives

☐ Slut angives (ej fast)

Klik her for at redigere i doseringen.

Hvis du har ændret i doseringen på en ordination, hvortil der ligger aktive recepter på Receptserveren, så kommer følgende vindue. Du skal her tage stilling til, om recepten skal annulleres på Receptserveren. Der vil ikke automatisk blive lavet en ny recept.

FMK X


Der er 1 aktiv recepter med anden dosering.
Skal denne annulleres?

Pausér/ophæv pausering

Du kan vælge at pausere en ordination, hvis patienten ikke skal tage dette præparat i en periode. Ordinationen vil blive markeret med et P. Pauseringen kan efterfølgende ophæves igen, hvorefter ordinationen er aktiv som normalt.

Interaktionskontrol

Interaktionskontrollen bliver automatisk udført, hver gang du ordinerer medicin samt ved ajourføring af medicinkort. Du kan også manuelt aktivere interaktionskontrollen vha. punktet under højrekliksmenuen. Eksempel på interaktionskontrollen:



Ikone	Beskrivelse	paracetamol	warfarin
	Kombinationen kan anvendes under visse forholdsregler. Mere information	Findes i: Panodil	Findes i: Marevan
	Kombinationen kan anvendes. Mere information	Findes i: Zanidip	Findes i: Marevan

Advarselsfilter
Vis varsel ved større end: Grøn ved forekomst af mindst af: Gul OK (F10)

Du kan selv indstille varslingsniveauet for interaktionskontrollen vha. de to drop down bokse.

I den første boks kan du indstille, hvilke varsler du ønsker at se. Det vil sige, at "Grøn" viser alle farver, "Gul" viser kun gule og røde, mens "Rød" kun viser røde varsler (hvis de forekommer). Den anden boks beskriver minimumsfarve, der skal forekomme for at udløse varslene. Det vil sige, at "Grøn" varsler ligemeget, hvilken farve kombinationen udløser, men "Gul" valgt, så skal der forekomme en gul eller rød varsel for, at kontrollen vises osv. Hvis "Gul" er valgt i boks 2, og interaktionskontrollen kun indeholder grønne varsler, så vises interaktionskontrollen ikke.

Vis effektueringer

Effektueringer benyttes til at markere hvilken medicin, der er udleveret eller indgivet til patienten. Billedet, der kommer frem, viser hvilke præparater, der er udleveret/indgivet til patienten samt deres styrke og mængde.

Opret effektuering

Hvis en patient får udleveret eller indgivet medicin, kan du oprette en effektuering på dette, så det bliver vist på FMK. Opret først en ordination u/recept, hvis præparatet ikke allerede findes på FMK. Højreklik på ordinationen og vælg *Opret effektuering*.

Effektivering [redacted]

Dato: 23-05-2016

☐ Udleveret ☒ Indgivet

Præparat: Furix Skif præparat

Form: tabletter

Styrke: 20 mg

Enkelt enheder Pakning

Antal: 2 tablet / tabletter

OK (F10)

Vælg om præparatet udleveres til patienten på klinikken, eller om det indgives med detsamme.

Oplys hvormange piller eller pakninger det drejer sig om.

Klik på OK (F10) for at lægge oplysningerne på FMK.

Markér medicinkortet som ajourført

At ajourføre en patients medicinkort betyder, at du tjekker om FMK, efter din bedste overbevisning, stemmer overens med det, som patienten aktuelt er i behandling med. Medicinkortet bør afstemmes jævnligt, så alle har så retvisende et billede som muligt. Er der receptserver-recepter uden tilknytning (løse recepter), som stadigvæk er åbne, forsvinder disse IKKE ved afstemning af medicinkortet på FMK

Afstemning skal ikke forveksles med en medicingennemgang, som er en kritisk gennemgang af al patientens medicin mht. om patienten får den rette medicin, korrekt dosis m.m.

Recepter

I højre side af FMK er der markeret, hvis der til ordinationen findes aktive recepter, som patienten kan hente på apoteket.

Udleveret	R
	
	
	
	
	

Der er aktive recepter på ordinationen.

Hvis der er udleveret på recepten, skrives dato for seneste udlevering.

Der er aktive recepter på ordinationen, men ordinationen er udløbet/afsluttet. (Patienten kan stadigvæk hente på recepten).

Under vinduet med de ordinationer, der ligger på FMK på patienten, kan du få vist faneblade med recepter. Højreklik i FMK vinduet og vælg *Vis recepter* (genvejstast R).

Senest ajourført 04.04.2016 af Lægeklinikken Grønnegade													Senest hentet 17-05-2016
det fælles medicinkort			1 Privatmarkeret bliver ikke vist										
S	D	T	/Endret	Ophører	Præparat	Form	Styrke	Indikation	Dos. Start	Dos. Slut	Dosering	Udleveret	R
∞			02-03-2016		Lariam	tabletter	250 mg	mod malaria			1/4 tabl samme ugedag fra 1 uge før ankomst til 4 uger efter afrejse		👤
∞			02-02-2016		Ibuprofen	filmovertrukne tabletter	400 mg	mod muskelsmerter			1 tablet 3 max gange daglig		👤
∞			05-01-2016		Oxynorm	kapsler, hårde	20 mg	mod stærke smerter			1 kapsel 3 gange daglig		👤
∞	d		04-11-2015		Unikalk Forte	tabletter	m D-vitamin	kalktilskud			1 stk daglig		👤
∞			07-10-2015		Marcan Spinal Tung	injektionsvæske, opløsning	5 mg/ml	til epidural analgesi			Dosering efter skriftlig anvisning		
			19-04-2016	08-06-2016	Omeprazol "Actavis"	enterokapsler, hårde	20 mg	mod mavesyre i spiserøret			2 kapsler daglig		👤
			02-03-2016	10-06-2016	Panodil	filmovertrukne tabletter	500 mg	mod smerter			1 tablet 3 gange daglig		👤
			07-10-2015	22-05-2016	Marevan	tabletter	2,5 mg	blodfortyndende	07-10-2015		1 tablet morgen og aften		👤
U			04-04-2016	04-05-2016	Methotrexat "Sandoz"	tabletter	2,5 mg	mod psoriasis			5 tabletter samtidigt 1 gang ugentlig		👤

Recepter uden tilknytning										Tilknyttede recepter (1)										Aktive recepter (30)										Status
Dato	Præparat		Styrke	Indikation	Dosering	Pakning el. dosisdisp.	G	T	Udleveret																					
19-04-2016	Omeprazol "Actavis"	enterokapsler, hårde	20 mg	mod mavesyre i spiserøret	2 kapsler daglig	100 stk.		G																						Åben
25-08-2015	Lariam	tabletter	250 mg	mod malaria	1/4 tabl samme ugedag fra 1 uge før ankomst til 4 uger efter afrejse	8 stk.		G																						Åben
18-06-2015	Oxynorm	kapsler, hårde	20 mg	mod stærke smerter	1 kapsel 4 gange daglig	98 stk. (blister)		G																						Åben
04-11-2015	Unikalk Forte	tabletter	m D-vitamin	kalktilskud	1 stk daglig	04-11-2015 - 04-11-2017		G																						Behandles
20-08-2015	Marevan	tabletter	2.5 mg	blodfortyndende	1 + 0 + 1 + 0 tabletter	100 stk.		G																						Åben
07-10-2015	Ibuprofen	filmovertrukne tabletter	400 mg	mod muskelsmerter	1 tablet 3 max gange daglig	250 stk.		G																						Åben
08-09-2015	Ibuprofen	filmovertrukne tabletter	400 mg	mod muskelsmerter	1 tablet 3 max gange daglig	250 stk.		G																						Behandles
29-10-2015	Ibuprofen	filmovertrukne tabletter	400 mg	mod muskelsmerter	1 tablet 3 max gange daglig	250 stk.		G																						Behandles
02-02-2016	Ibuprofen	filmovertrukne tabletter	400 mg	mod muskelsmerter	1 tablet 3 max gange daglig	250 stk.		G																						Åben

Recepter uden tilknytning viser de løse recepter/papirrecepter, som apoteket har fået ind. De findes måske som ordinationer på FMK.

Tilknyttede recepter viser de recepter, som er tilknyttet den ordination, som du står på i det øverste vindue.

Viser en oversigt over alle aktive recepter på patienten.

Recepter kan have følgende status:

Åben = Der er ikke hentet på recepten endnu (den er stadigvæk aktiv).

Behandles = Et apotek er i gang med at behandle recepten.

Delleveret = En recept der kan hentes på flere gange. Patienten har hentet min. 1 gang, og der er min. 1 gang tilbage.

Afsluttet = Der er hentet på recepten. Der kan ikke hentes mere.

Annuleret = Recepten er blevet annulleret. Der kan ikke hentes på recepten.

Kladde = Bestilling fra hjemmesygeplejen.

Ugyldig: Apoteket kan markere en ordination som ugyldig.

Dosisdisp.: Ordinationer til dosisdispensering har et afvigende statusforløb: Status starter som "Åben", herefter henter apoteket ordinationen og sætter evt. status til "Behandles". På det tidspunkt hvor den første ekspedition af en ordination sker med en markering af, at lægemidlet er dosisdispenseret sættes status til "Dosisdisp.". Dette betyder, at ordinationen herefter er låst for alle andre end dette apotek.

Tilknyttede recepter

Under fanebladet *Tilknyttede recepter* kan du bl.a. annullere (slette) en recept på receptserveren. Ordinationen vil stadigvæk stå på FMK, men patienten vil ikke kunne hente på recepten. Hvis du højreklikker på en recept, får du en højrekliksmenu med følgende muligheder.

Recepter uden tilknytning		Tilknyttede recepter (1)		Aktive recepter (6)	
Dato	Præparat	Form	Styrke	Indikation	Dosering
25-08-2015	Pantoloc	enterotabletter	40 mg	mod mave- og tarmproblemer	1 tablet 2 gange dagligt ved eradikations- behandling
Afhægt recept Annuller recept Vis effektueringer					

Afhægt recept: Fjerner receptens tilknytning til lægemiddelordinationen. Recepten bliver til en løs recept og vil være at finde under fanebladet "Receptserver-recepter uden tilknytning". Du kan tilknytte den til en anden ordination ved at højreklikke på ordinationen i FMKs øverste del og så vælge Tilknyt. Denne mulighed benyttes, hvis et lægemiddel fx seponeres og erstattes af et andet. Recepten fra det "gamle" kan så tilknyttes den nye ordination.

Annullér recept: En recept kan annulleres, dvs. at det forhindres, at der kan udleveres på den (igen). Denne handling kan ikke omgøres, hvilket betyder, at der skal laves en ny recept, hvis patienten alligevel skal kunne få udleveret lægemidlet.

Vis effektueringer: Viser de reelle udleveringer på den aktuelle recept. Ønskes en samlet udleveringsoversigt for alle recepterne tilknyttet en lægemiddelordination, samt evt. indgivninger og klinikudleveringer, så vælg samme punkt i højrekliksmenuen for lægemiddelordinationen.

Begreber i FMK

Her er en liste over de begreber, der kan optræde i forbindelse med Det Fælles Medicinkort (FMK).

A

Ajourfør medicinkort

Når der er ryddet op i alle recepterne, dvs. når patientens komplette aktuelle medicinering fremgår af de aktuelle lægemiddelordinationer på FMK, ajourfører tandlægen (lægen) medicinkortet.

Aktuel lægemiddelordination

Den eller de lægemidler, som patienten aktuelt er i behandling med. Herunder lægemiddelnavn, dosering, indikation og varighed.

D

Doseringsstart/doseringsslut

En lægemiddelordination kan indeholde flere doseringsstart- og doseringssluttidspunkter, hvis patienten trappes op eller ned i dosis af præparatet. Hver doseringsperiode fortæller, at i denne periode får patienten denne dosis, i næste doseringsperiode får patienten en anden dosis af samme præparat.

Dosisdispensering

Et lægemiddel fyldes på en doseringsbeholder af enten et apotek eller sygehusapotek.

E

Effektivering

Udlevering eller indgivelse af medicin til patienten f.eks. hos lægen, på sygehuset, hos tandlægen eller på apoteket.

Læger/tandlæger kan oprette effektivering for at markere, at medicinen er udleveret eller indgivet til patienten.

I

Invalideret medicinkort

Lægemiddelstyrelsen har, som de eneste, muligheden for at invalidere et medicinkort, såfremt de

vurderer, at oplysningerne på kortet ikke er retvisende (dvs. enten er ukorrekte eller upålidelige). Når et medicinkort er invalideret, er kortets indhold stadig synligt for alle, ligesom der stadig kan redigeres i kortet.

Når et medicinkort bliver invalideret, skifter farven i banneret foroven til rød, så man tydelig kan se medicinkortets status.

K

Klausuleret tilskud

Tilskud der kan gives til nogle lægemidler, når de ordineres ved bestemte sygdomme.

L

Lægemiddelordination

En lægemiddelordination er den eller de lægemidler, som patienten aktuelt er i behandling med, og i al sin enkelthed dét som FMK beskæftiger sig med. Herunder lægemiddelnavn, dosering, indikation (årsag) og eventuel varighed (start- og slutdato). En lægemiddelordination er forstadiet til en receptordination, og tandlægen (lægen) kan derfor vælge at tilknytte recepter til de aktuelle lægemiddelordinationer eller danne nye recepter på baggrund af disse.

M

Medicinafstemning på FMK

En medicinafstemning er en aktivitet, hvor en læge registrerer (opretter/opdaterer/seponerer) patientens lægemiddelordinationer, så FMK afspejler den aktuelle medicinering og giver et retvisende billede heraf.

P

Pausering

En pausering betyder en midlertidig afbrydelse af medicineringen. Eksempelvis kan en lægemiddelordination med et blodfortyndende lægemiddel pauseres i forbindelse med, at patienten skal til tandlægen.

Privatmarkering

Hvis en patient ønsker at skjule en aktuel lægemiddelordination for andet sundhedspersonale end den ordinerende læge/tandlæge, kan patienten bede lægen/tandlægen om at få ordinationen privatmarkeret. Herefter vil det kun være synligt, at der eksisterer en privatmarkeret lægemiddelordination, men ordinationens indhold vil være skjult.

Når en ordination er privatmarkeret, vil denne blive vist med lysegul baggrund og med fed og kursiv tekst.

R

Receptordination

En receptordination svarer til at skrive en recept til patienten, og dækker samtidig over de receptskrivninger, der er foretaget.

Recepter uden tilknytning (løse recepter)

En recept uden tilknytning er en recept, der ikke er tilknyttet en aktuel lægemiddelordination på FMK, og som stammer fra receptserveren.

Receptserver

Receptserveren er en server, administreret af Lægemiddelstyrelsen, som indeholder alle de elektroniske eller ekspederede recepter, der er indsendt/indtastet af læger eller apoteker (og til dels også tandlæger). FMK medicinkortet henter automatisk receptoplysninger fra receptserveren.

S

Suspenderet medicinkort

Hvis en patient f.eks. indlægges på et sygehus, kan sygehuset suspendere FMK medicinkortet for at fortælle, at FMK ikke er opdateret og derfor ikke nødvendigvis retvisende. Når patienten så udskrives overføres ordinationerne til FMK og suspenderingen ophæves.

Seponering

En seponering angiver, at lægen/tandlægen aktivt har valgt at afslutte en given lægemiddelordination. Det angives med et 'S' og baggrunden bliver grå.

T

Tilskud

Tilskud der kan gives til nogle lægemidler, når de ordineres ved bestemte sygdomme.

V

Værdispringsreglen

Værdispringsreglen træder i kræft i forbindelse med privatmarkering og er kendetegnende ved, at den skelner mellem på den ene side patientens interesse i, at oplysningen ikke videregives, og på den anden side, modståendes interesse i at oplysningen videregives. Der er med andre ord tale om en undtagelsesbetegnelse, som kræver, at en konkret afvejning af det enkelte tilfælde, og hvor videregivelsen af oplysninger, kun sker rent undtagelsesvis (som oftest i akutte tilfælde)

Værdispringsreglen sker, hvis patienten på grund af sin tilstand, f.eks. bevidstløshed eller alderdomssvækkelse, er ude af stand til at give samtykke. Det samme gælder, hvis sundhedspersonale eller andre f.eks. formodes at være smittet af patienten. Videregivelse af oplysninger til andet sundhedspersonale til brug for behandling af patienten, skal ske i patientens interesse, og der skal tages hensyn til ønsker, som patienten eventuelt på et tidligere tidspunkt måtte have fremsat. Ved videregivelse skal den, som oplysningen angår, snarest muligt herefter orienteres om videregivelsen og formålethermed.